

Pessoas com alto grau de imunossupressão

- I – Possuem imunodeficiência primária grave;
- II – Fazem quimioterapia;
- III – São transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;
- IV – Vivem com HIV/aids com CD4 < 200 cel/mm³;
- V – Usam corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;
- VI – Usam drogas modificadoras da resposta imune*;
- VII – Estão em terapia renal substitutiva (hemodiálise);
- VIII – Têm doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, autoinflamatórias e doenças intestinais inflamatórias).

* Drogas modificadoras da resposta imune consideradas para fim de elegibilidade: Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatioprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, Baracitinibe e Upadacitinibe).

Para os imunossuprimidos é obrigatória a apresentação de documento que comprove esse alto grau. Levar original e cópia, que ficará anexada à ficha do paciente.